

幼
幼
新
書

幼幼新書卷第十五

傷寒變動 凡二十門

後學古吳陳履端于始輯

吳江周之琦仲大校

傷寒自汗第一

巢氏傷寒者寒氣客皮膚搏血氣使腠理閉密氣不
宣泄蘊積生熱故頭痛體疼壯熱也汗出者陽虛受
邪邪搏于氣故發熱陰氣又虛邪又乘陰陰陽俱虛
不能制其津液而汗

活人書病人歲無他病時發熱自汗不愈衛不和也

先時發汗則愈屬桂枝太陽病發熱汗出者為榮弱
衛強欲救風邪者宜桂枝湯又病常自汗此榮氣和
外不諧也以衛氣不共榮氣諧故爾以榮行脉中衛
行脉外復發汗榮衛和則愈傷風自汗太陽病發熱
汗出惡風脉緩為中風屬桂枝湯又太陽病項背強
几几反汗惡風桂枝加葛根湯主之汗出而渴五苓
散不渴茯苓甘草湯雖仲景云傷寒自汗用桂枝然
須仔細假令傷風自汗若脉浮而弱設當行桂枝服
湯後無桂枝脉息證候而煩者勿再服若自汗小便

數尤不可伸景云太陽病自汗四肢拘急難以屈伸
若小便難者桂枝湯加附子小便數者勿與宜芍藥
甘草湯若悞桂附攻表便咽乾煩躁厥逆嘔吐甘草
乾薑湯以復其陽若厥愈足溫更與芍藥甘草湯脚
即伸若胃氣不和譫語與調胃承氣湯微澹則止其
譫緣芍藥甘草湯主脉浮自汗小便數者寸口脉浮
為風大為虛風則微熱虛則兩脛攣小便數仍汗出
為津液少勿用桂枝宜芍藥甘草補虛退風熱通治
悞服桂枝後病證仍存陽明病自汗不惡寒反惡熱

澀澀汗出若陽明病汗多而渴勿與猪苓湯汗多胃燥猪苓復利小便故也故仲景云陽明發熱汗多急下之以汗多津液外出胃中燥大便必硬譫語者調胃承氣湯雖陽明汗多急下若小便自利為津液內竭勿攻須蜜導大便陽明病汗出脉遲微惡寒表未解宜桂枝湯陽明法多汗若脉浮無汗而喘發汗愈且麻黃湯亡陽自汗太陽病發汗多遂漏不止其人惡風當溫經宜桂枝加附傷寒尺寸脉俱緊汗出者亡陽也屬少陰法當咽痛而復吐利其人熱不退內

拘急四肢疼厥逆而惡寒四逆湯主之汗多不止溫
粉撲之若汗多不止必惡風煩躁不得卧者先服防
風白朮牡蠣湯次服小建中湯諸方見後
仲景桂枝湯

桂枝

芍藥

各三兩

甘草

二兩

剉麻豆大抄五錢匕水盞半薑五片棗二枚煎一
盞溫服須臾飲熱稀粥一盞以助藥力溫覆時許
微汗佳此湯西北二方人四時俱驗江淮間惟春
冬可行春末及夏至前桂枝證加黃芩一分謂陽

旦湯夏至後加知母半兩石膏一兩或加升麻一分若人素虛寒者用古方或曰桂枝最難用雖表不解脈浮可發汗宜桂枝湯須常自汗小便不數手足溫或手足稍微冷少頃溫身雖微似煩又增寒始可行若無汗小便數或手足冷不惡寒或飲酒家不喜甘者勿用

桂枝加葛根湯

桂枝

甘草

各一兩

葛根

二兩

芍藥

麻黃

各兩半

劉麻豆大抄五錢七薑四片棗一枚水一盞半煎
八分服覆取汗

五苓散

猪苓

白朮

茯苓

各三分

澤瀉

一分兩

桂枝

去皮半兩
不見火

篩散抄三錢白湯調各治秤

茯苓甘草湯

茯苓

桂枝

去皮各二兩

甘草

炙一兩

劉麻豆大五錢七水盞半薑五片煮八分溫服

桂枝加附子湯

桂枝去皮

芍藥各兩半

甘草炙一兩

附子炮淨半兩

劉麻豆大五錢匕薑四片棗一個水盞半煮八分

溫服

芍藥甘草湯

白芍藥

甘草炙各二兩

劉麻豆大五錢匕水盞半煮八分溫服

甘草乾薑湯

甘草炙四兩

乾薑二兩

劉如麻豆抄五錢七水盞半煮八分分減服
調胃承氣湯

甘草

一兩

芒硝

一分

大黃

去皮二兩

劉如麻豆服五錢水一盞煎七分服

蜜煎導若土瓜根及大猪膽汁亦可導

蜜四兩銅器中微火煎凝如飴攪勿焦捻作挺如

指許內穀道中

麻黃湯

麻黃

去節兩半

桂枝

一兩

甘草

炙半兩

杏仁

卅五個

劉如麻豆五錢七水盞半煮八分溫服取汗傷寒
熱病藥性須涼性熱夏月服有發黃班之失

四逆湯

甘草

炙二兩

乾薑

半兩

附子

生一個

劉如麻豆服四錢水盞半煮七分溫服強人加附
半個乾薑兩半

溫粉法

白朮

藁本

無亦可

芎

白芷

等分細末一兩米粉三兩和撲周身

防風白朮牡蠣湯

防風

牡蠣黃炒

白朮

等分細末二錢酒調下米飲亦得日二三汗止服

小建中湯

小建中湯

桂枝

去皮兩半

芍藥

兩三

甘草

兩二

膠飴

半升舊有

微瀉或嘔者去之

剉如麻豆五錢七水盞半薑四片大棗一枚煮八分去滓下膠飴兩匙許煎化溫服日三夜二尺脉

尚遲再服加黃耆末一錢

傷寒頭汗出第二

活人書病人表實裏虛元腑不開則陽氣上出汗見于頭者五內乾枯胞中空虛津液少也復下之為重虛然頭汗有數證傷寒五六日頭汗微惡寒手足冷心下滿不欲食大便鞭硬作脉細為陽微結必有表復有裏也脉沉亦有裏汗出為陽微假令純陰結不復有外證為半裏半表脉雖沉緊不得為少陰病蓋陰不得汗今頭汗知非少陰也胡燕傷寒五六日汗下

胃脅滿微結小便不利渴不嘔但頭汗往來寒熱心

煩此表未解柴胡桂枝乾薑湯頭汗身無汗齊頸而還小便

不利渴引水為痰熱在裡身必發黃五苓散陽明病

下之外熱手足溫不結胃心懊憹飢不能食但頭汗

心下緊滿無大熱頭汗茯苓湯仲景名水結在

證小半夏加茯苓湯

小柴胡湯

柴胡四兩黃芩兩半腹脹痛去之加芍藥兩半心

人參兩半不渴外微熱去之加桂枝兩半取汗愈

欬嗽去參棗加五味一兩一分乾薑一兩

甘草

兩半

半夏

此一分湯洗胃中煩不嘔去

之一湯去此加參三分苦薑根二兩

棗

六枚膏下痞硬去此加牡蠣二兩熬

劉如麻豆抄五錢七薑四片棗一個水盪半煮八

分溫服日三

柴胡桂枝乾薑湯

柴胡

桂枝

皮去

黃芩

各兩半

苦薑根

兩二

乾薑

甘草

牡蠣

熬各一兩

劉如麻豆抄五錢七水盪半煮八分溫服食頃載

服

茵陳蒿湯

茵陳蒿

兩半

大黃

去皮兩半

大梔子

三枚半

剉麻豆大水二大盞煮茵陳次內二味煮八分溫
服日三利尿如阜莢汁

梔子豉湯

肥梔子

十四枚擘

香豉

四合

剉如麻豆服五錢水二盞煎八分溫服得快吐止

後服

赤茯苓湯

赤茯苓

陳皮 焙

人參 各一兩

半夏 洗去滑

茅薤

白朮

炮各半兩

搗粗末服四錢水鍾半薑五片煎七分不時溫服

小半夏加茯苓湯

半夏

五兩洗七次

白茯苓

三兩

劉如麻豆半兩水三盞煎一盞薑四錢取汁投藥中更煎一兩沸不時熱喫

傷寒欬第三

傷寒後嗽附

葉氏肺應皮毛主氣寒邪客皮隨氣入肺故嗽盛有

瀉血

寒搏氣入藏府故表裏俱熱熱退肺尚未知邪猶未盡隨氣入肺與肺相搏故傷寒後猶嗽

活人書太陽證嗽小青龍小柴胡少陰證嗽真武湯四逆散猪苓湯大抵熱在焦必水停心下肺為之浮

肺主欬水氣乘之故欬而微喘仲景云傷寒表不解

心下水乾嘔發熱而欬小青龍湯主之小便不利

麻黃加往來寒熱胃脅滿痛或欬小柴胡湯小柴胡去參棗

乾薑若小陰證嗽四肢沉重疼痛小便不利自下

利而效真武湯主之

真武湯加五味乾薑大抵治水氣軟病在陽青龍湯病在陰真

武湯四肢厥逆腹中痛或泄利而效四逆散主之

加四逆

味乾薑

下利六七日效嘔渴心煩不得眠猪苓湯主之

錄驗陳橘皮湯治嗽佳

石壁經

唇青

一作白

皁紫嗽聲連肺胃于中養毒涎夜嗽

胃高兼肚脹汗收體熱氣難宣食逆復齟言語

重嗽聲頻作豈能痊行風發汗方為妙定使風

除絕本源

內熱蘊積賊風所傳致寒熱相感便嗽久則胃高如覆盆肚脹聲重當汗行風次調氣化涎利膈若腹藏結當利

千金麻黃湯治傷寒發熱欬嗽頭面熱

麻黃

薑

黃芩

各一兩

甘草

炙

石膏

芍藥

桂心

各半兩

杏仁

十枚

呔咀水四升煮升半分二服兒小減

聖惠白朮散治內中冷外傷寒咳嗽或時寒熱頭痛

白朮

紫花

麻黃

去根節

厚朴

薑汁炙

人參

杏仁麩炒

甘草

炙微赤 各半兩

赤芍藥

陳皮

去白焙 各一分

粗散一錢水一盞煎五分不時量服

貝母散治傷寒痰逆欬嗽不乳

貝母煨

桔梗

甘草炙

人參

乾薑炮裂

半夏

洗七次去滑 各一分

陳皮

去白焙

杏仁

麩炒 各半兩

桂心

兩一

粗散一錢水小盞薑少許煎五分不時溫服量兒

枇杷葉散治傷寒壯熱欬嗽嘔吐

枇杷葉

一分拭去毛炙微黃

川升麻

人參

貝母

煨各半兩

茅根

一兩

竹茹

三分

粗散一錢水小盞棗一枚薑少許煎五分不時量

溫服

杏仁散

杏仁

麩炒

貝母

煨

川升麻

甘草

炙

麻黃

去根節各半兩

粗散一錢水小盞薑少許煎五分不時量溫服

嬰孺貝母湯治傷寒壯熱加嗽

貝母

石膏

各八分

升麻

知母

黃芩

梔子

芍藥

各六分

杏仁

柴胡

各五分

羚羊角

射干

各四分

甘草

炙二分

切水四升煮升二合為四服一二歲量與

麻黃湯治傷寒嗽喘急

竹葉

八分

貝母

八分

柴胡

升麻

各七分

枳實

炒楚

紫苑

各三分

梔子

杏仁

各六分

甘草

炙

麻黃

去節各二分

大黃

十分

切水四升煮升三合葢歲兒為四服四歲為二服

張漢麥門冬湯

麥門冬

欬冬花

人參

紫苑

各一兩

桂心

兩半

甘草

分炙一

羅細末入杏仁廿粒麩炒細研拌服一錢水一鍾

薑三片煎五分溫服

活人書小青龍湯

麻黃

一兩半微利去此加羌花子大熬赤若嘔

從苓二兩喘去此加杏仁一兩一分

半夏

此一兩一分洗渴去

芍藥

桂枝

細辛

乾薑

甘草

炙各兩半

五味子

一分兩

劉如麻豆抄五錢水一盞半煮八分溫服

真武湯

茯苓

三分小便利減

芍藥

三分下利去此加乾薑二分

附子

一枚炮去

皮破八片用二片嘔

去此加薑煎成三兩

白朮

二分細辛乾薑各一分

劉如麻豆抄五錢薑四片水盞半煎八分溫日三

服

猪苓湯

猪苓

茯苓

阿膠炙

澤瀉

滑石各一兩

劉如麻豆抄五錢水盞半煮七分溫服

四逆散

甘草炙

枳實炒黃

柴胡

芍藥各一兩

咳加五味乾薑各半兩下利悸加桂半兩小便不利加茯苓半兩腹痛加附半枚炮裂泄利下重先濃煎薤白湯內藥末三錢匕煮一二沸溫服或細散米飲下二錢日三

古今錄驗橘皮湯

陳橘皮

紫苑

麻黃

杏仁

當歸

桂

甘草

黃芩

各半兩

劉如麻豆抄五錢七水盞半煎一盞服

傷寒發喘第四

活人書傷寒喘只有太陽陽明二證太陽頭疼發熱

身疼惡風無汗喘宜汗麻黃湯

桂枝証醫誤下不止

葛根黃芩黃連太陽誤下微喘表未解桂枝加厚朴

杏子湯汗後勿更行桂枝湯汗出而喘無大熱麻黃
膏湯 杏子石 陽明汗出不惡寒腹滿而喘有潮熱宜下承

氣湯

脈浮無汗，愈宜麻黃湯。

太陽陽明合病喘而胃滿勿下

宜麻黃湯。又汗後飲水多，欬而微喘，以水停心下，腎

氣乘心，故喘。小青龍去麻黃加杏仁，小腹滿去麻黃

加茯苓

何去麻黃失治，心下有水而喘，不當汗。小便不利，小腹滿，故去麻黃加茯苓。

形證傳傷寒歌

身熱皆因積熱生，至今潮熱變傷寒。先除積熱

方成路，便作傷寒事轉難。夾食夾驚瀕下積，癖

他虛實與重看。喘虛莫下熱當下，更與調榮患

廼安

先潮熱後傷寒加喘急失調成驚難治用南星九

傷寒變
疹門

或白丁香膏

未見

少退潮熱如下盡熱方調

氣或虛驚邪與蚘蛭丸一二服

一切
痢門

用意調理

聖惠人參散治傷寒心胃煩悶喘促

人參

麻黃

去根
節

甘草

炙各
半兩

貝母

煨

杏仁

麩炒各
一分

粗散一錢水小盞煎五分不時量溫服

活人書麻黃湯見傷寒自汗門夏至後加知母半兩

石膏一兩黃芩一分蓋麻黃性熱故也冬春虛寒

者用正方

葛根黃芩黃連湯

葛根

兩四

黃芩

黃連

各兩半

甘草

炙一兩

劉如麻豆抄五錢匕水盞半煮八分溫服日三二

桂枝加厚朴杏子湯

桂枝

去皮

芍藥

各一兩

甘草

六錢三字

杏仁

十七個

厚朴

薑炙六錢三字

劉如麻豆抄五錢匕薑四片棗一個煎八分溫服

覆取汗

麻黃杏子甘草石膏湯

麻黃

二兩

杏仁

廿五個

石膏

四兩

甘草

炙一兩

劉如麻豆抄五錢七水盞半煮八分溫服

大承氣湯

大黃

生二兩酒洗

枳實

二枚半炒

芒硝

半合

厚朴

薑炙四兩

劉如麻豆抄五錢七水二盞煎八分去滓八芒硝再煎一二沸溫服利為度

傷寒鼻衄第五

葉氏肺應皮毛主氣開竅于鼻寒客皮膚搏氣成熱

熱乘血血得熱則流從臍出為衄凡熱病應衄者壯
熱頻發汗不出或未及發汗而臍躁喘息臍氣鳴即
衄凡衄兒止半升數合則熱因以歇若一二升死

活人書傷寒太陽證衄血乃解陽氣重故也仲景謂
陽盛則衄脉浮緊無汗服麻黃湯不中病發煩目瞑

劇者必衄小衄脉尚浮緊者再與衄後脉微勿用若

脉浮自汗桂枝湯不中病證尚在必頭疼甚而致衄

小衄而脉尚浮再與衄後脉微勿用大抵傷寒衄血

不可汗脉微故也衄勿發汗汗出額上陷脉緊急直
視不瞬不眠然無汗而衄脉尚浮

緊再與麻黃湯有汗而衄脉已微黃芩芍藥湯犀角

地黃湯衄血不止茅花湯若衄而渴心煩飲水則吐
先五苓散次竹葉湯陰證無熱不衄若少陰病但厥
無汗強發之必動血或從口鼻或從耳目是謂下厥
上竭難治

千金麥門冬湯治兒未百日傷寒鼻衄身熱嘔逆

麥門冬十八銖石膏寒水石甘草炙各半兩

桂心八銖

呔咀水二升半煮一升服一合日三

聖惠竹茹散治傷寒臍衄煩熱頭痛

苦竹茹

甘草

炙

黃芩

各半兩

麥門冬

焙

伏龍肝

石膏

各一兩

粗散一錢水小盞煎五分不時量兒溫服

治臍衄數日不止

生地黄

汁

白蜜

各一小盞

蒲黃

一兩

和微煖服半盞量兒分減頻服

生乾地黄二兩剉銀器中酒一中盞煎七分不時溫

分三服

亂髮燒灰細研頻吹鼻中

張渙立應散治傷寒血熱妄行鼻衄不止

石榴花焙

乾葛根

蒲黃各半兩

細末半錢生地黃汁調下

活人書黃芩芍藥湯

黃芩三分

芍藥

甘草炙各半兩

粗末三錢水一盞煎六分溫服

犀角地黃湯

犀角無升麻代

牡丹皮各一兩

芍藥三分

生地黃半斤

劉如麻豆脹五錢七水盞半煮一盞有熱如狂加黃芩二兩脉大來遲腹不滿自言滿者為無熱不用

茅花湯

茅花大一把水三盞煎一盞分二服無花用根

竹葉石膏湯

淡竹葉

把半

石膏

兩四

半夏

半二分

人參

甘草

兩各半

麥門冬

兩半

嘔加薑一兩

劉如麻豆抄五錢水盞半粳米百粒煮八分米熟

湯成溫服

張漢雞峰方治傷寒時氣衄血不止

松煙墨細末雞子清和如桐子白湯下十粒

生蘿蔔汁半盞鹽少許攪勻頓服

傷寒嘔哕第六

巢氏傷寒胃氣虛熱承虛入胃胃得熱則氣逆故嘔
活人書無陽則厥無陰則嘔嘔者足陽明胃經陽明
氣下行令厥上行氣逆則嘔仲景云嘔雖多不大便
勿下與小柴胡湯上焦得通津液得下胃氣決和然

汗出而解大抵嘔證不一各有治法要之小柴胡湯

尤當服胃脇滿而嘔日晡潮熱加芒硝若不止心下

急鬱鬱微煩與大柴胡若大便秘加大黃大柴胡治嘔最妙為

枳實去穢壓虛嘔雖有陽明勿下古人治嘔用半夏生薑孫真人云

薑嘔家勝藥仲景皆用太陽陽明合病必下利若不

熱胃有邪腹痛欲嘔黃連湯太陽少陽金匱諸嘔吐

合病自利若嘔者黃芩加半夏生薑湯穀不下小半夏湯小半夏加茯苓小半夏加橘皮湯

可選用嘔而發熱主小柴胡嘔而發渴主猪苓湯先

嘔却渴為欲解急與之先渴後嘔為心停心下屬飲

家仲景云本渴飲水而嘔柴胡不中宜治膈間水主
赤茯苓湯若少陰證而嘔真武湯去附子加生薑若
汗吐下後虛煩不得眠若嘔者主梔子生薑豉湯傷
寒差後嘔者餘熱在胃腕竹葉湯加薑主之大凡嘔
者飲食不下乾嘔為哕或因汗出或因有水或下利
脾胃有熱便乾嘔官局桔梗湯最佳仲景汗出乾嘔
者桂枝證也表不解心下有水乾嘔發熱者小青龍
也身涼汗出兩脇痛或乾嘔者十棗湯也少陰下利
脉微白通湯利不止厥逆無脉乾嘔煩者白通加猪

膽汁湯少陰下利裏寒外熱脉微欲絕或乾嘔通脉
四逆湯乾嘔吐沫頭痛吳茱萸湯傷寒論食穀欲嘔得湯反劇屬上焦也仲景無治法大抵吳茱萸湯湯治少陽證穀入胃而嘔屬陽明宜小柴胡湯若直嘔吐而復脚弱或疼作脚氣治

聖惠治傷寒煩熱頭痛嘔逆麥門冬散

麥門冬

石膏

各三分

甘草

炙半兩

粗散一錢水小盞煎五分不時量溫服

傷寒吐逆不寒藿香散

藿香

丁香

木香

葛根

各一兩

人參

甘草

炙各半兩

粗散一錢水小盞煎五分臨時分減溫服

涼一方一溫

用酌

嬰孺治傷寒壯熱嘔吐蘆根湯

生蘆根

合五

知母

十二分

淡竹青皮

五分

水三升煮一升為三服更用冬瓜汁一升減水一

升煮

活人書柴胡芒硝湯

柴胡

一兩

黃芩

人參

甘草

各半兩

半夏

四錢半
酒洗

芒硝

一兩

劉如麻豆杪五錢七薑四片棗一枚水盞半煮八

分去滓內芒硝微沸溫服

大柴胡湯

柴胡

四兩

黃芩

芍藥

各兩半

半夏

一分

枳實

二枚
炒

劉如麻豆杪五錢七薑四片棗一枚水二盞半煮

八分去滓溫服利為度

欲下加大
黃二兩

官局桔梗湯

桔梗

半夏

陳皮

各一兩

枳實

半兩

粗末三錢七水一盞薑五片煎七分溫服

小半夏湯

大半夏

七枚

薑

薄五片

水一盞煎半盞食後溫服

葛根加半夏湯

葛根

一兩

麻黃

去節三分

甘草

炙

芍藥

桂枝

去皮各半兩

半夏

二分半

剉如麻豆抄五錢七薑四片棗一枚煎八分溫服

覆取汗

黃連湯

黃連

甘草

炙

乾薑

桂枝

各三分

人參

二兩

半夏

二兩半

劉如麻豆每十錢七棗二枚水二盞煮盡半分二

服

黃芩加半夏生薑湯

芍藥

甘草

各二分

黃芩

三分

半夏

二分半

劉每五錢薑四片大棗一枚水二盞煮八分溫服

小半夏加橘皮湯

大半夏

枚七

薑

薄切五片

橘皮

片一大

水一盞煎半盞食後溫服

梔子生薑豉湯

梔子

枚七

薑

半二兩

香豉

合二

分二服水二盞煮梔子薑至一盞內豉同煮七分

溫服快吐止

十棗湯

芫花

熬炒赤

甘遂

大戟

等分搗秤再杵二三百下先以水升半煮肥棗十枚取八合去滓內藥強人一錢七羸人半錢棗湯送下平旦服若下少病不除明日再服加半錢利後糜粥自養合下不下令脹滿通身浮腫死

白通湯

附子生一枚

乾薑一兩

剉如麻豆抄五錢七水盞半葱白四寸煮七分服白通加豬膽汁湯

附子生半枚

乾薑半兩

葱白二莖

溺二合半

水一盞煮五分去滓內猪膽汁半合和溫分服
通脉四逆湯自汗門

面赤加連翹葱九莖腹中痛去葱加芍藥二兩嘔
加薑二兩咽痛去芍藥加桔梗一兩利止脉不出
去桔梗加人參二兩未差急作一劑脉續續出愈
吳茱萸湯

吳茱萸

洗一兩二錢
三次

人參

三

剉如麻豆服四錢薑五片棗一個水二盞半煮八
分分二服

莊氏治傷寒頭痛和氣止逆止渴人參散

人參

白朮

麻黃去根節

藿香

甘草炙

乾葛各一分

石膏透明半兩

末一錢水一盞葱白一寸豉卅粒煎五分溫服

傷寒發渴第七

巢云傷寒熱渴是熱入藏藏得熱則津液竭燥故渴

活人書傷寒脉浮而渴屬太陽表不解心下有水氣

加苦蕒湯太陽病脉桂枝汗後煩渴白虎加人參脉浮小便不利微熱消渴五苓散四五日身熱惡風脅

下滿手足溫而渴小柴去半夏加人參苦蕒根太陽證身熱而渴者為風溫苦蕒根湯有汗而

渴屬陽明

白虎加人參湯虛人老人春秋月與竹葉石膏湯陽明病頭汗小便不利渴引水身

必發黃宜茵陳湯小柴胡去半夏加人參苦薑湯

傷風寒熱或發熱惡風而

渴屬少陽

少陽脅下癢不大便而嘔舌上白胎而白

利而渴屬少陰

傷寒熱于藏流于少陰主腎腎惡燥故渴而引飲少陰下利咳嗽而嘔渴

猪苓湯利飲飲水太陽證無汗而渴勿與白虎湯

者有熱白頭翁湯云渴欲飲水無表證白虎加人參湯脈浮發熱無汗

表未解勿與白虎湯意小青龍小柴胡湯也仲景云

表不解心下有水咳或渴小青龙去半夏加苦薑四

五日身熱惡風脅下滿手足溫而渴小柴胡去半夏

加人參汗後脈洪大而渴與之陽明證汗多而渴者

苦薑勿與五苓散

汗多胃中燥猪苓復利小便便故也意竹葉湯與之仲景云陽明病發作有時汗

多急此仲景妙法仲景猪苓湯證六脉浮凡病非大

渴勿與水若小渴咽乾小小呷滋潤之令胃和若大

渴煩躁甚能飲一斗與五升全不與則乾燥無由作

汗發汗死人見渴飲水作汗小渴遂劇飲致停飲心

下滿結喘死者甚衆當五苓散或陷胃丸金匱云時氣五六日

渴欲飲水不能多不當與何者以腹中熱尚少不飲

之常令不足人見仲景云得病反能飲此為欲愈小

渴強飲因成禍大抵傷寒飲水過多致水停心下氣

上乘心為悸為喘結于胃脅為水結胃胃中虛胃冷

為噦嘔冷氣相薄為噎上迫肺為欬瀆腸中為痢邪

熱所薄畜于下焦為小便不利若陽毒倍常躁盛大

小腹滿或裏急溢皮膚為腫

渴黑奴丸中暑伏熱深累取不差發渴不已酒蒸黃連丸

聖惠大青散治傷寒頭痛壯熱煩渴

大青

知母

柴胡

葛根

甘草炙

川升麻

黃芩

赤芍藥

梔子仁

各半兩

石膏

一兩

川芒硝

一分

粗散一錢水小盞煎五分不時溫服量兒

治傷寒壯熱頭痛口乾煩渴柴胡散

柴胡

麻黃

去根節各半兩

赤芍藥

黃芩

葛根

甘草炙各一分

石膏兩一

粗散一錢水小盞薑少許葱白三寸豉廿粒煎五

分不時溫服汗為效量兒丁時發有前胡半兩

治傷寒煩熱大渴不止赤瓜根

土瓜根

麥門冬焙

柴胡各半兩

葛根

枇杷葉

去毛炙各一分甘草

粗羅一錢水小盞煎五分不時溫服

張漢葛根湯治傷寒體熱煩渴

葛根

人參各一兩

麥門冬

甘草炙

白茯苓

澤瀉各半兩

細末一錢水八分一盞薑二片薄荷三葉煎六分

溫服

活人書白虎加人參湯

石膏

兩四

知母

兩半

甘草

兩半

粳米

合半

人參

三分

劉如麻豆抄五錢七水盞半煮八分米熟為度溫

服

苦薏根湯

苦蕒根分三 葛根生兩半 乾三錢 石膏兩二 人參

防風 甘草炙各半兩

劉如麻豆服五錢水盞半煎一盞服

白頭翁湯

白頭翁兩一 黃蘗 秦皮 黃連各兩半

劉如麻豆分五服水二大盞煮八分溫服不差更

服

大陷胃丸

大黃兩二 苦葶藶熱 芒硝 杏仁熱各三分

羅研如脂丸彈子大服一九甘遂

性猛酌虛實用

末一字

七白蜜一合水二盞煮一盞頓服一宿延下不下

再服

黑奴丸

麻黃

去節泡一二沸焙三兩

大黃

二兩

釜底煤

黃芩

芒硝

竈突墨

梁上塵

小麥奴

各一兩

羅末蜜丸彈子大新汲水研一九渴與冷水盡足

飲之須臾當寒寒竟汗出差日移五尺不汗再服

一丸瀕微汗麥奴麥未熟時叢中不成麥捻成黑
勃無此亦得瀕病人渴倍常可與不渴番成禍

酒蒸黃連丸

黃連

四兩無灰酒浸面上約一寸重湯熬

羅末糊丸熟水下三十九胃膈涼不渴效

傷寒大小便不通第八

巢氏寒搏氣而生熱熱流大小腸故澀結不通是內
熱不歇或乾嘔或言語而氣還逆上則心腹脹滿
聖惠大黃散治傷寒壯熱心躁頭痛口乾大小便赤

難

川大黃

炒兩

半

梔子仁

赤芍藥

甘草

炙

黃芩

各一分

粗散一錢水中盪煎五分量溫服利效

三黃散

川大黃

微炒

麥門冬

倍各半兩

石膏

一兩

甘草

炙

川芒硝

黃芩

黃連

各一分

粗散一錢水小盪煎五分類服利效

張漢犀角散治傷寒六七日大便不通熱甚

犀角

川大黃炮

柴胡各一兩

人參半兩

朴硝

甘草炙各一分

細末一錢水八分薑二片棗一枚煎五分溫服量
加減

活人書治壯熱頭目碎痛背搏拘急大熱衝上口苦
唇焦夜卧舌乾咽喉腫痛涕唾稠粘痰壅喫食不進
心脾躁熱眼澁睛痛傷寒臯塞四肢沉重語聲不出
百節痛大小便不利麩豆瘡時行瘟疫狂語多渴及
兒天癰夜驚洗心散

大黃米泔浸一炊慢炒

當歸炒

芍藥

甘草炙

荊芥各四兩

白朮炒一兩

細末抄二錢水一盞薑一片薄荷二葉煎八分溫
和滓服畧卧去枕少時如五藏壅實煎四五錢七
要澹轉熱服

傷寒發狂第九餘躁熱發狂附

活人書傷寒陽毒發狂畜血如狂證與脉俱不同病
人煩躁狂走妄言面赤咽痛脉實潮熱獨語如見鬼
為陽毒仲景云傷寒吐下後不解不大便六日至十餘日日晡潮熱不惡寒獨語如見鬼劇者不

識人循衣摸床惕惕不安微喘直視但發熱譫語大承氣湯若一服利止脉弦者陽生瀉者陰死陽證見陰脉死陽證脉瀉勿下無表證不寒熱唇燥欲漱水不欲入咽

脉微沉小腹鞭滿小便反利大便秘黑身黃發狂血

證諦也熱壯渴滿口燥脉反無熱為陰血證審其仲

愈外不解者尚未可攻當先解表宜桂枝湯外已解但小腹結者莢仁承氣湯攻其結大抵傷

寒當汗不汗熱在裏化為血喜忘如狂血上逆則喜

忘血下畜則內爭甚者抵當湯抵當丸輕者桃仁承

氣犀角地黄湯盡取黑物效有畜血證而外不解未

枝湯以解外緣失汗又火邪發驚狂者醫以火卧床

熱畜勝脫太陽經也

下或以火迫周身劫汗或熨成火邪其人亡陽煩躁

驚狂卧起不安桂枝去芍藥加蜀漆牡蠣龍骨救逆

湯桂枝甘草龍骨牡蠣湯凡灸及燒針後證似火劫者用劫法金匱風引湯尤

良驚癇門柴胡加龍骨牡蠣湯更捷

桃仁承氣湯

桃仁五十枚

大黃四兩

桂枝去皮

甘草炙

芒硝各二兩

劉如麻豆服五錢匕水二大盞煮八分溫服未利

移時再服

抵當湯即此為丸

水蛭十枚熬去子并碎入腹復生為害尤甚須剉石灰炒再熬

桃仁七枚

大黃去皮一兩酒洗 蜜虫十枚去翅足熬

劉如麻豆作二服水二盞煮七分溫服

桂枝去芍藥加蜀漆牡蠣龍骨救逆湯

桂枝 蜀漆洗去腥各兩半 甘草炙一兩 牡蠣二兩煨

龍骨二兩

劉如麻豆抄五錢七薑四片棗一枚水盞半煮八

分溫服

桂枝甘草湯

桂枝

去皮半兩

甘草

炙

牡蠣

熬

龍骨

等分

劉如麻豆抄五錢水盞半煮八分溫服

柴胡加龍骨牡蠣湯

柴胡

二兩

黃芩

一兩

鉛丹

人參

桂枝

茯苓

龍骨

牡蠣

煨各三分

半夏

湯洗六錢半

大黃

半兩

劉如麻豆五錢七薑四片棗一枚水盞半煮八分

溫服

傷寒結胃第十

活人書傷寒本無胃結應身熱下早熱乘虛入痞結

不散便成結胃

若誤轉未成結胃頻與理中湯自解

兼四逆湯便安胃中離和傷寒未退者候日數足可下承氣湯再下之其證心下緊滿

按之石硬而痛項強如柔瘕狀

發熱汗出不惡寒名柔瘕脉寸口

浮關尺皆沉大率當下脉浮大下之死尚宜汗

仲景結胃

脉浮勿下只用小陷胃湯尚有表證也兼以崔行功小柴胡湯等發表證罷方與結胃藥便安崔行功

云傷寒絕胃欲絕心高手叵得近大陷胃湯不差是

下虛逆氣已不理毒復上攻氣毒相薄結胃中枳實

理中丸理氣次療諸疾然結胃有三種大結胃

而不按

胃連臍腹堅硬大陷胃九

小結胃

按之心不痛小陷胃湯

水結胃脅亦名結

胃

頭微汗但結胃無大熱小半夏加茯苓湯小柴胡去棗加牡蠣

又有熱實結胃

胃中

煩躁心內懊懷舌上燥渴脉沉滑者皆熱證大陷胃湯

寒實結胃

無熱證三物白散枳實理

中丸近世結胃多行金針丸硫黃陽起石寒實結胃或

差若熱實胃行之死大陷胃湯用甘遂太峻須量虛

實輕重大陷胃丸最穩聖餅子灸臍尤不可藏結仲

景無治法大抵藏結如結胃狀飲食如故時時下利

陽脉浮關脉小細沉緊舌上白胎滑者難治

理中湯

人參

乾薑炮

甘草炙

白朮

各三兩

腹痛加人參兩半寒加乾薑一兩渴欲得水加白朮兩半臍上築腎氣動也去白朮加桂四兩吐多去朮加生薑三兩下多用朮悸加茯苓二兩四肢拘急腹滿下利或轉筋去朮加生附一枚
劉如麻豆抄五錢七水盞半煮八分溫服日三

小陷胃湯

半夏

湯洗二兩半

黃連

兩一

劉如麻豆服五錢蘇蘇半枚水二盞煎九分溫服
未知再服利黃涎便安

大陷胃湯

錦紋大黃

兩半芒硝兩一

甘遂

赤連珠者一兩

末水三盞煮大黃至一盞去滓下芒硝一沸下甘

遂溫服快利止

又方

桂枝

人參

各一兩

甘遂

半兩

大棗

三枚

蘇蘇實

一枚用四分之一

劉五錢七水二盞煮八分溫服胃中無堅物勿服

枳實理中丸

枳實

麸炒十片

茯苓

人參

白朮

乾薑

炮

甘草

細末煉蜜丸如雞子黃熱湯化一九連進二三服

胃中豁然渴加苦薑二兩下利加牡蠣二兩煨

三物白散

桔梗

貝母

各三分

巴豆

熬黑研如脂一分

散白飲和服強人半錢羸減之病在膈上必吐膈

下必利不利進熱粥利不止進冷粥身熱皮粟不
解引衣自覆若水啜并洗益令熱却不得出當汗
不汗則煩假令汗出已腹中痛與芍藥三兩如上
法

古方金針丸治結胃傷寒

陽起石

不灰木

各半兩

硫黃

一分

巴豆

杏仁

各三枚

搗細末糯米粥丸如櫻桃以針劄窠子晒乾如患
者以劄針用麻油紙燒盄盡細研炒生薑湯調一

丸患重夾轉藥兩三九金針九下不妨更置虛實

存此者欲人知須審用

傷寒腹痛第十一 附腹滿

栗氏傷寒熱入腹傳于藏氣結聚故腹滿若挾毒者

腹滿疑作痛心煩懊悶多死

活人書腹痛本太陽病反下之腹滿時痛是有表復

有裏仲景用桂枝加芍藥湯主之痛甚加大黃即小建中

太陰脈弱自利設當行大黃芍藥宜減之胃難經云虛陽氣易動故也下利者先煎芍藥十餘沸

痛為實宜下外景云發汗不解腹滿痛宜大承氣湯腹

刀刀折書 長下五 我川

有熱痛有冷痛尺脉弦腸鳴泄利而痛冷也小建中

湯仲景云陽脉濡陰脉弦法當腹中急痛與小建中

湯不差與小柴胡湯

小柴胡去黃芩加芍藥

陰證腹痛即四逆

散通脉四逆加芍藥湯腹痛小便不利真武湯關脉

實腹滿大便秘按之痛實也桂枝加大黃湯黃連湯

大承氣湯主之腹脹滿陰陽不和也桔梗半夏陽最

良仲景論太陽證發汗後腹脹滿厚朴生薑半夏甘

草人參湯下後心煩腹滿卧起不安梔子厚朴湯吐

後腹脹滿調胃承氣湯少陰病六七日腹脹不大便

急下承氣湯

桂枝加芍藥湯

桂枝

去皮
三兩

芍藥

六兩

甘草

二兩

劉如麻豆抄五錢七薑四片棗一枚水盞半煮八分溫服下利先煎芍藥三四沸

桂枝加大黃湯

桂枝

去皮
兩半

芍藥

三兩

甘草

炙

大黃

各一兩

痛甚加大黃大實痛加兩半羸者減

劉如麻豆抄五錢七薑四片棗一枚煮八分溫服

桔梗半夏湯

枳實

熱炒半兩

桔梗

微炒

半夏

薑製

陳皮

各一兩

粗末四錢水一盞薑三片煎七分熱服

厚朴生薑半夏甘草人參湯

厚朴

四兩

半夏

一分兩

甘草

一兩

人參

半兩

剉如麻豆抄五錢七水鍾半薑五片煮八分溫服

梔子厚朴湯

大梔子

七枚

厚朴

炙二兩

枳實

熱炒二枚

切分二服水二盞半煮八分溫服得吐止

傷寒下痢第十二

傷寒後下痢附

巢氏傷寒表熱雖歇而裏熱猶停腸胃與水穀相併腸胃虛則泄痢痢色黃若熱不止變血痢若重遇冷熱相加變赤白滯痢

活人書傷寒下痢多種須辯識陰陽

三陽下痢身熱太陰下痢手足

溫少陰厥陰下痢身不熱大抵挾太陽脉証用溫熱藥發黃生斑死

太陽陽明合病必

痢葛根湯主之

下痢頭疼腰痛肌熱身疼鼻乾脉浮大而長

太陽少陽合

病自痢黃芩湯主之若嘔黃芩加半夏生薑

下利頭疼胃滿

或口苦咽乾或往來寒熱而嘔脉浮大而弦

陽明少陽合病必痢脉不負

者順負者失互相剋賊名負

下痢身熱胃脘痞滿乾嘔或往來寒熱脈長大

而弦蓋陽明土脈長大少陽木脈弦合病土被木賊更下痢為胃困若脈不弦者順為土不負負者死

自痢不渴屬太陰

四逆湯理中湯

自痢而渴屬少陰

白通湯白通加

猪膽湯通脈四逆湯猪苓湯四逆加人參湯可檢證用

餘下痢皆汗下後證大

抵傷寒下痢瀕者脈與外證下痢脈大者虛脈微弱

者自止下痢日十餘行脈反實者逆下痢脈數滑者

有宿食下之愈脈遲滑者實痢未便止宜下下痢三

部脈皆平按其心下硬者急下挾熱痢臍下必熱大

便赤黃及腸間津汁垢膩

謂之腸垢

寒毒入胃則翻臍下

必寒腹脹滿大便或黃白或青黑或下利清穀濕毒
氣盛則下利腹痛大便如膿血或如爛肉汁下利欲
飲水者有熱下利譫語有燥屎寒毒入胃四逆湯理
中湯白通加附子四逆散加薤白挾熱利黃芩白頭
翁湯三黃熱艾湯薤白湯赤白脂丸濕毒下膿血者
桃花湯地榆湯黃連阿膠散雖自利而渴屬少陰然
三陽下利亦有飲水者有熱也三陰下利耳溫少陰
自利清水心下痛口乾燥宜下此又不可不知

少陰泄利

下重多投熱藥濃煎葱白湯內四逆散用枳實芍藥
之類尋常胃中不和腹中雷鳴下利生薑瀉心湯二
石方所書

法不特
傷寒

葛根湯

葛根

二兩

麻黃

兩半

桂枝

去皮

甘草

炙

芍藥

各一兩

剉如麻豆抄五錢七薑四片棗一枚水盪半煮八

分溫服覆取汗

黃芩湯

黃芩

兩半

芍藥

甘草

各一兩

剉如麻豆抄五錢棗一枚水盪半煮八分溫服

黃芩加半夏生薑湯

黃芩

錢三

半夏

半二分

芍藥

甘草

各二分

劉五錢薑四片大棗一枚水二盞煮八分溫服
四逆加人參湯

甘草

兩二

附子

枝生一

人參

兩一

乾薑

兩半

劉如麻豆抄五錢七水盞半煮八分溫服日三
三黃熟艾湯

黃芩

黃連

黃蘗

各三兩

熟艾

半雞子大

劉如麻豆水二盞煮七分溫服

薤白湯

豉

半斤
綿裹

薤白

握一

梔子

七枚大
者破之

劉如麻豆水二升半煮梔子十沸下薤白煮二升
下豉煮升二合服一湯盞

赤石脂丸

黃連

當歸

各二兩

赤石脂

乾薑

炮各
一兩

末煉蜜丸桐子米飲吞卅丸日三

桃花湯

赤石脂

四兩

乾薑

一分

劉如麻子四錢粳米二撮水盞半煎一盞去滓入赤石脂末方寸七日三一服愈即止

地榆散

地榆

黃連

微炒

犀角

茜根

黃芩

各一兩

梔子仁

半兩

粗末四錢水一盞薤白三寸煎六分不時溫服

阿膠散

黃連

二兩微炒

阿膠

微炒

黃蘗

微炒各一兩

梔子仁

半兩

粗末四錢水一盞煎七分不時溫服

生薑洗心湯

黃芩

甘草炙

人參各兩半

乾薑

黃連

各半兩

半夏

一分兩

剉如麻豆抄五錢七水盞半薑七片棗二枚煮一

盞服

丁時發苦薑散治傷寒煩躁大便不止身熱

苦薑根

麥門冬

甘草炙

柴胡

葛根

各半兩

枇杷葉

一分拭毛炙黃

末一錢水一盞煎七分溫服

傷寒口内生瘡并喉痛第十三

巢氏傷寒口生瘡熱毒在歲上衝胸膈氣發于口故生瘡

咽喉痛者心胃熱盛氣上衝咽喉故痛若挾毒則喉痛結腫水漿不入毒還入心煩悶死

活人書咽喉痛有陰陽二證脉浮數面赤班班如錦

紋咽喉痛嚥濃血者陽毒也

陽陽盛陰陰暴絕必躁狂走妄言面赤咽痛身如

錦紋或下利赤黃脉洪實或骨促宜酸苦藥令陰氣復而大汗解矣葶蘆苦酒湯陽毒升麻湯大黃散扼子仁湯黑奴丸可選用近治傷寒脉洪大內外結熱舌卷焦黑中如烟煤疊布數重新水漬稍換去水

搭胃上日數易熱甚脉沉遲手足厥冷或吐利咽痛
置病人水中亦良

少陰證也病源云此下部脉都不至陰陽隔絕邪客
足少陽膽毒上衝故咽不利或痛生瘡傷寒脉陰陽
俱緊汗出少陽也屬少陰法當咽痛而復吐利汗下
熏熨俱不可汗出者藁本粉傅之咽喉痛者甘草湯
桔梗湯猪膚湯半夏散通脉四逆去芍藥加桔梗湯
麻黃升麻湯可選用又有伏氣病謂非時暴寒中人
伏氣于少陰經旬月乃發脉微弱怯先咽痛似傷寒
非喉痺病次必下痢用半夏桂甘湯次四逆散只一

二日差古謂腎傷寒也

十物升麻湯治傷寒變熱毒病身熱面赤口燥心腹
堅急大小便不利或口瘡或壯熱因四肢攣掣驚仍
作痢時發時醒醒後身熱如火

治胃中客熱口臭不思飲食或肌煩不欲食齒齦腫
疼膿血舌口咽有瘡赤眼目臉重不欲開瘡疹已發
未發甘露飲子

葶藶苦酒湯

苦酒

即米醋
升半

葶藶

熬一
合

生艾汁

半升無黃熟
艾或根汁

煎七合作三服

陽毒升麻湯

升麻

分二

犀角

射干

黃芩

人參

甘草

劉如麻豆水三升煎升半飲一湯盞食頃再服溫覆手足出汗不解重作

大黃散

川大黃

兩半

桂心

分三

甘草

炙

木通

大腹皮

各一兩

川芒硝

兩二

桃仁

廿一枚
麤炒

粗末四錢水中盞煎六分不時溫服利為度

梔子仁湯

梔子仁

知母

赤芍藥

大青

各一兩

柴胡

兩半

川升麻

黃芩

杏仁

炒熱

石膏

各二兩

甘草

半兩炙

粗末抄四錢水中盞薑半分豉百粒煎六分不時

溫服

仲景甘草湯

甘草

二兩

劉如麻豆四錢七水盞半煮六分溫服日二

桔梗湯

桔梗

一兩

甘草

二兩

劉如麻豆抄五錢水盞半煮八分溫分再服

豬膚湯

豬膚

二兩六錢半

水二大盞半煮一盞許去滓加白蜜合半白粉一

合

半夏散

半夏

洗湯

桂枝

去皮

甘草

炙

等分服三錢水一盞煎八分冷少少嚥

麻黃升麻湯

麻黃

去節二兩半

升麻

當歸

各一分

知母

黃芩

姜

各三分

芍藥

天門冬

桂枝

茯苓

甘草

炙

石膏

綿裹

白朮

乾薑

各一分

剉如麻豆抄五錢水盞半煮八分溫服一炊久進

一眼汗出愈

半夏桂枝甘草湯

半夏洗湯

甘草炙

桂心

劉如麻豆四錢七水盞半煎七分冷少含細嚥

十物升麻湯

升麻

白薇

麻黃

姜蕤

柴胡

甘草各半兩

黃芩一兩

朴硝

大黃

釣藤各一兩

劉如麻豆服三錢水一盞煎七分去滓下硝煎溫

服

甘露飲

熟地黄

生地黄

天門冬

麥門冬

枇杷葉

毛去

枳殼

炒

黃芩

石斛

山茵陳

甘草

細末二錢水一盞煎六分食後臨卧溫服

傷寒發斑第十四

餘發斑附

葉氏胃主肌肉傷寒溫壯熱挾毒蘊積于胃薰發肌肉狀如蚊蚤噬赤斑起周匝遍體此或傷寒或時氣或溫病由熱不歇入胃變毒發斑赤者十生一死黑

者十死一生

漢東王先生斑瘡水豆耳麥湯散解之次透關散更

進敗毒散各三二服不退進槐花散一服微利觀音

散調胃

胃氣不和門

再用七寶輕青丹

單傷寒門

活人書溫毒發斑冬冒寒毒至春始發

初在表或一發汗吐下表

證未罷毒氣不散故發斑黑膏主之又冬月溫暖人

感平戾之氣春或被積寒所折毒氣不泄至天氣暄

熱溫毒始發肌肉斑爛癰疹如錦紋而欬心

悶但嘔青汁葛根橘皮黃連橘皮湯並佳

發斑與時氣發斑並同或未發汗或已經汗下而熱

毒不散表虛裏實乘虛出于皮膚所以發斑疹如錦

紋俗名楚瘡素問謂疹

下早熱氣乘虛入胃下大遲熱留胃俱發斑服熱藥過多

亦發

大抵斑勿表蓋表虛裏實若發汗重令開泄更

增斑爛當用化斑湯白虎加人參湯中添萎蕤玄參

升麻湯阿膠大青四物湯猪膽雞子湯紫雪尤妙可

下者調胃承氣湯

暑月病陽重者常宜體候見微有斑急治

寶鑑歌

傷寒毒熱胃中存勿作斑瘡出滿身若見口唇

烏似墨只應長往在逡巡

形證論歌

傷寒胃熱作斑瘡倒靨因風氣受傷損汗內虛
多紫黑大者為陰小者陽

惠濟歌

斑毒常推是豆瘡肺兼腎藏有風傷渾身熱甚
四肢冷肺裏煩寃痛莫當胃發連皮肌肉下好
交心熱變清涼次與調脾仍趕趁體冷舌黑在
隄防

聖惠治熱毒發斑心神煩悶大青散

大青

玄參

川升麻

川大黃

微炒

甘草 炙

梔子仁 各半

篩散一錢水小盞煎五分不時量兒溫服

治陽毒壅盛發斑心躁皮膚焮痛犀角散

犀角

川升麻

白蘚皮

梔子仁

漏蘆

川大黃 炒

赤芍藥

甘草 炙各半兩

寒水石

一兩

篩散一錢水小盞煎五分不時分減溫服

治斑瘡大便壅滯心神煩躁大黃散

川大黃

微炒

甘草 炙

枳殼 炒

黃芩 各半兩

細散不時新汲水調一錢三歲下半錢

治發斑散惡毒氣

生葵菜葉絞汁少服又黑豆汗徐服

治斑疹瘡瘡心神煩躁眠卧不安青黛散

青黛

半兩

細研煖磨刀水調半錢日三量兒服

漢東王先生麥湯散治傷寒欬嗽溫壯水痘

地骨皮

炒

甘草

炙

滑石

各半

麻黃

去節

人參

知母

羌活

大黃

煨紙

甜葶藶

隔紙炒
各一分

末嬰兒服一字或半錢三五歲一錢水半盞小麥
七粒或二七粒煎數沸服

通經透關散治斑瘡水痘心躁發渴大小便不通及
赤色口舌生瘡

地扁竹

嫩半
兩焙

山梔仁

炒分
半

大黃

木通

車前子

並炒

滑石

瞿麥

去粗
梗

甘草

炙各
一分

末嬰孩服一字二三歲半錢四五歲一錢水半盞
紫草三寸煎數沸溫服

活人書黑膏

生地黄

斤半

好豉

升一

猪膏二斤合露之前三分減一絞滓內豆大雄黃
麝攪和盡服之毒從皮出愈忌蕪荑

葛根橘皮湯

葛根

橘皮

杏仁

知母

黃芩

麻黃

去節

甘草

炙各半兩

劉如麻豆服五錢水盪半煎一盪溫服

苦車橘皮湯

黃連

四兩

橘皮

杏仁

枳實

麻黃

葛根

厚朴

甘草

各一兩

劉如麻豆抄五錢水盪半煎一盪服下痢當先止

化斑湯

人參

石膏

各半兩

萎蕤

知母

甘草

各一分

劉如麻豆抄五錢水盪半糯米一合煎八分米熟

為度溫服

元參升麻湯

元參

升麻

甘草

炙各半兩

劉如麻豆抄五錢七水盞半煎七分溫服

阿膠大青四物湯

大青

四兩

阿膠

甘草

並炙各一兩

豉

八合

劉如麻豆抄五錢水盞半煎一盞旋入膠煎

猪膽雞子湯

猪膽

苦酒

各三合

雞子

一枚

合煎三沸強人盡服羸人煎六七沸服汗出居

傷寒發黃第十五

亦名黃病餘發黃附

東氏熱入脾胃蘊積與穀氣相搏蒸發于外故皮膚
悉黃眼亦黃脾胃肌肉俱象土故色黃或傷寒或時
行或溫病皆熱不時解入胃也凡發黃下痢心腹滿
死脉沉細死半歲內兒傷寒溫病身黃亦是胃熱將
息過度所為薄其衣數與除熱粉散自歇不得妄與
湯藥及灸

活人書寒濕在裏不散熱蓄脾胃腠理不開瘀熱與
宿穀相薄鬱蒸不消故發黃

熱蓄南方暑濕近夏病

為瘧濕熱相薄民
多病瘧甚為明腫

然發黃與瘀血外證及脉俱相似

但小便不利為黃小便自利為瘀血要之發黃心脾
蘊積發熱引飲脉必浮滑而緊數若瘀血證即如狂
大便必黑為異凡病人身體發熱頭面汗出身無汗
齊頸而止渴引水小便不利必發黃茵陳蒿湯五苓
分十加茵陳散五分溫水調小便利如皂莢汁赤一宿
黃減黃從小便出古云治濕不利小便非其治也梔
子蘄皮湯麻黃連翹赤小豆湯可選用傷寒欲發黃
急用瓜蒂末口含水搐一字入臍出黃水用茵陳酒
調五苓散白虎與黃證相近遍身汗為熱越白虎證

也頭面汗頸下無汗發黃證也又一身盡痛發熱身
如薰黃此太陽中濕也仲景云傷寒發汗已身目為
黃寒濕在裏不解故也勿下于寒濕中求之

風雨襲
虛山澤

蒸氣人多中濕濕流關節頭身體煩痛脉沉緩為中
濕脉細非也主一身盡痛發熱身黃小便自利木附
湯若小便不利大便反快當利小便宜
甘草附子湯五苓散麻黃加白朮湯脉弦浮大短

氣腹滿脅及心痛久按之氣不通臍乾不得汗嗜卧
身目悉黃小便難有潮熱時時欬少陽中風也主
小柴胡湯

千金方

搗土瓜根汁三合服

聖惠
安和

又韭根汁澄清澹臯中出黃水差

外臺療天行三日外忽覺心上滿堅硬脚手心熱變
為黃不療殺人秦朮湯

秦朮

紫草

白鮮皮

黃芩

梔子仁

等分切水一大升半牛乳一大升煮七合分二服
意量

經驗方治遍身金色

瓜蒂

六月六日收

丁香

入甘鍋燒烟盡各四十九個

細研勻兒半字吹鼻內及揩牙

聖惠茵陳散治黃病身如橘色

茵陳

川朴硝

各一兩

梔子仁

川大黃

炒

黃芩

犀角

寒水石

木通

各半兩

篩散一錢水小盞煎五分不時溫服意量

治脾胃熱毒致肌肉變黃小便赤色心中煩懊茵陳

丸

茵陳

梔子仁

川大黃

炒

甘草

炙

秦朮

各一兩

川朴硝

半兩

末煉蜜丸如菉豆不時湯下五丸量與

治諸黃大黃散

川大黃

炒

黃連

苦薏根

黃芩

梔子仁

各半兩

粗散一錢水小盞煎五分不時溫服意量

大黃丸

川大黃

炒

甜葶藶

隔紙炒紫

茵陳

各半兩

羅末煉蜜丸如梧子不時新汲水研三丸量服

治身面俱黃黃瓜丸

黃連

一兩

胡黃連

半兩

羅末黃瓜一枚去瓢留蓋子入藥末蓋定大麥麴
裹燒焦去麴擣丸菜豆大一歲一九量加

嬰孺茵陳湯

茵陳

升麻

黃芩

柴胡

知母

羚羊角

各八分

大黃

石膏

各錢二分

梔子

一錢

芍藥

六分

瓜蒂

七個

藍葉

一升

甘草

炙二分

切水五升煮升半一二歲為八服四五歲為四服

張漢蘆根湯

蘆根

一兩

茵陳

山梔

黃芩

甘草

炙各兩半

細末一錢水八分薄苛三葉煎五分溫服

活人書茵陳蒿湯

茵陳蒿

嫩者兩半

大黃

去皮半兩

梔子

大者三枚半

劉如麻豆水二大盞煮茵陳減半內二味煮八分

溫服日三

梔子蘘皮湯

梔子

八枚

黃蘘

一兩

甘草

炙半兩

劉如麻豆抄五錢水盞半煮七分溫服

麻黃連翹赤小豆湯

麻黃

去節

連翹

用根

甘草

炙各一兩

赤小豆

升半

生梓白皮

二兩半

杏仁

廿枚

劉如麻豆抄五錢薑四片棗一枚水盞半煮八分

溫服

木附湯

白朮

二兩

附子

個半

甘草

炙一兩

剉麻豆抄五錢薑五片大棗一枚水盪半煮七

分溫服日三一服覺身痺半日許再服三服都盡

如冒狀是附朮走皮逐水氣未得除耳法當加桂

一兩大便堅小便自利不加

甘草附子湯

甘草

白朮

各一兩

附子

炮一枚

桂枝

二兩

剉如麻豆抄五錢水盪半煮七分溫服汗出解身

腫加防風二兩悸氣小便不利加茯苓兩半

麻黃加朮湯

麻黃

兩半

桂枝

去皮一兩

甘草

炙

蒼朮

各半兩

杏仁

卅五枚

剉如麻豆抄五錢水盞半煮八分溫服

傷寒餘熱不退第十六

巢氏傷寒邪氣與正氣交爭正氣勝則邪氣散故寒熱俱歇若邪氣未盡時干正氣則壅痞還熱故餘熱往來不已其狀肉常溫溫赤熱

聖惠傷寒四五日熱入裏下後熱不除是餘熱未盡

漢東王先生日中可夜熱甚天明復涼為餘熱未解
聖惠歲時散逐毒氣

歲時

川大黃

炒

川升麻

甘草

炙

黃芩

大青

各半兩

羅散一錢水小盞煎五分不時量服

治傷寒汗利後熱不除口乾心煩不乳黃耆散

黃耆

知母

赤茯苓

甘草

炙

黃芩

各一分

麥門冬

焙半兩

羅散一錢水小盞煎五分不時溫量服

麥門冬散治傷寒汗利後餘熱不解身體疼痛心神
虛煩不思乳食

麥門冬

川升麻

柴胡

前胡

各半兩

元參

犀角

子芩

葛根

赤芍藥

甘草

各一分

羅散一錢水小盞薑少許煎五分不時溫量服
治傷寒後餘熱不除心神不安茯神丸

茯神

麥門冬

焙

鐵粉

朱砂

各半兩

犀角

梔子

白蘚皮

川升麻

元參

車前子

搗羅煉蜜丸如棗豆不時湯下五丸量加

傷寒後餘熱不除四肢不利用浴湯

川大黃

甘草

防風

丹參

白朮

各半兩

雷丸

三分

散一兩水三升煎二升半去滓密室中浴兒宜避

風隔日再用

嬰孺猪脂和摩
兒頭足遍身

醫局治傷寒汗後表證解心胃煩渴欲飲水反吐或
下痢後七八日邪毒不解熱結在表表裏俱熱時時

惡風大渴舌乾燥煩欲飲水數升又治夏月中暑毒汗出惡寒身熱而渴白虎湯

石膏

洗廿五斤

知母

百五十兩

甘草

燂七十兩

細末服三錢水盞半粳米三十餘粒煎一盞溫服或加人參食後服夏宜歇春秋并亡血虛家勿服

治傷寒當取白虎湯此方叙邪毒不解熱結在裏故收之

嬰孺除熱粉散

雷丸

三兩

牡蠣

桂心

各一兩

為粉粉兒身

張漢解傷寒邪熱餘毒清涼湯

當歸

大黃

生地黄

各一兩

芍藥

甘草

炙各半兩

細末一錢水八分竹葉薄苛各少許煎五分溫服

傷寒勞復第十七

活人書傷寒新差血氣尚虛津液未復因勞動生熱熱復入經絡名勞復仲景云小柴胡湯主之脉浮者

汗解

柴胡桂枝湯

脉實者下解

大柴胡湯

又大病勞復枳實梔

子湯千金起死麥門冬湯又大病新差脾胃尚弱穀

氣未復強食過多停積不化發熱名食復新病善安

病乾噎食夏腹中雷鳴下痢生薑瀉心湯仲景枳實梔子湯黃帝曰熱病已愈時有所

遺者何也岐伯曰諸遺者熱甚而強食故有所遺也若此者皆病已瘳而熱有所藏因其穀食相薄兩熱

相合故有所遺也黃帝曰善治遺奈何岐伯曰視其虛實調其逆從何使必已食肉則復多食則遺此其

禁也廣濟療勞復雄鼠屎散許仁則七味葱白湯可選

用

千金五味子湯治傷寒久不除差後復劇瘦瘠骨立

五味子十銖甘草炙當歸各十銖芒硝五銖

石膏兩一大黃麥門冬黃芩

刀折壽
卷十五
張

前胡

黃連

各六銖

以咀水三升煮升半服二合得下便止量加減

活人書柴胡桂枝湯

柴胡

二兩

半夏

三錢一字

甘草

炙半兩

桂枝

去皮

黃芩

人參

芍藥

各三分

剉如麻豆抄五錢薑四片棗一枚水盞半煮八分

溫服

枳實梔子湯

枳實

楚炒二枚

梔子

肥者七枚

豉

二兩

清漿水二盞半煮八分內枳實梔子取九分下豉
再煮五六沸溫服覆汗出有宿食內大黃如博棊
子五六枚同煎

麥門冬湯

麥門冬

兩一

甘草

兩二

剉如麻豆水二小盞粳米半合煎未熟去米約水
小盞半入藥五錢棗二枚竹葉十五片同煎一盞
服

雄鼠屎散

雄鼠屎

二十七粒兩頭尖者

梔子

十四個

枳殼

炙三枚

粗末四錢水盪半葱白二寸豉三十粒煎一盞分

二服勿令病人知

許仁則七味葱白湯

葱白

連鬚半升

乾葛

三合

新豉

半合綿裹

薑

三分

麥門冬

乾地黄

三兩

勞水

四升杓洋千遍

煎三分減二分二服漸覆取汗

傷寒失音第十八

聖惠喉嚨氣之道路喉嚨氣之門戶舌者聲之機口

者聲之扇風寒客喉嚨間故卒無音

茅先生方

金毛狗脊 甘草

等分末一錢煮臘桔頭大水六分煎四分服

集效方

桂指面大含之漸漸聲音如磬

王氏三拗湯

麻黃

全

甘草

生

杏仁

全

等分服三指撮水一大盞煎七分時時溫呷

傷寒變疽第十九

石壁經歌

先前五日臉紅鮮一見生人怕又驚

一傷寒變疽七日前

兩臉唇青怕語言

驀覩胸前赤痣起漸同梅李一般形

血光齒上時聞臭指甲無紅色似銀會者可醫
無苦病不識言風道熱驚用藥表脾涼上膈心

涼疽伏始安寧

鳳髓經宜二聖散表

傷寒變疹門

形證論表發用參苓散涼心南星丸

傷寒變疹門

不退解

表散

門慢驚

去毒托裏散

傷寒變
疹門

參苓散治嗽化痰

人參

麻黃

甘草

炙

款花

各一錢

小半夏

湯浸十一次

葶藶

各半錢

馬兜鈴

三個

末服半錢桑皮湯下

傷寒變疹第二十

石壁經歌

預先五日戰如寒不覺看來又似癩纔發有同

梅李樣眼睛青碧臉紅鮮手心如火毛髮立腫

裏狂言卧不安躁熱嫌人撥手睡又生喘息氣
相連二三歲時為疹子此候須知有病源智者
莫令通藏府只將丸散表心間能催疹子添光
大七日如期定却安

傷寒失表毒氣攻裏而未安凡冬月春夏初精明
色辰勿同驚風治

形證論先有蘊熱忽風傷腠理發熱狂言氣急生涎
天南星丸退心間風涎微用解表退傷寒量虛實宣
瀉托裏散勻氣如不宣卒未安

形證論初如傷寒或似驚風辯子細出在皮膚宜平和藥表解勻氣更量肥瘦即通利關竅勻氣瘰癧疹在皮膚中

可通利已出通利內虛即毒反入損人

鳳髓經治疹痘欲出不出二聖散

浮蘋

香白芷

等分服半錢或一錢麝香酒下

治疹痘不出用藥發出餘熱未退發渴熱水廼下血

牛蒡散

解斑疹

甘草節

荊芥穗

牛蒡子

炒略

等分末錢半解毒薄苛湯下未出紫草湯下進數服

形證論治急驚風因赤體或變熱遂留不出因滯潮熱天南星丸

天南星

去皮一個

朱砂

錢一

蝎

半錢

輕粉

少許

末酒麪糊丸如菜豆服七粒薄苛湯下日二

治傷寒變瘡疹通關勻氣托裏散

人參

麻黃

甘草節

各一分

白朮

蔓荊子

紫草

各一錢

白茯苓

半錢

升麻

半分

未一錢瘡未出好酒調已出香湯調下

卷中張仲景方見別門者不錄據此考本門

自汗門

五苓散

桂枝湯

四逆湯

小建中湯

調胃承氣湯

藁本粉即溫粉法

頭汗門

小柴胡湯

門內某方去某加某湯其去其加者只據本方無別見餘倣此加減三方

赤茯苓湯

茵陳湯

欬嗽門

小青龍湯

加減一方

猪苓湯

真武湯

四逆散

加減四方

發喘門

麻黃湯

大承氣湯

承氣湯

鼻衄門

竹茹生薑湯

竹葉石膏湯

竹葉湯

犀角地黄湯

嘔哕門

大柴胡湯

白通湯

加減
二方

黃連湯

通脈四逆湯

加減
一方

發渴門

白頭翁湯

大陷胃丸

黑奴丸

結胃門

理中湯

下痢門

生薑瀉心湯

幼幼新書卷第十五